

## PROTOCOLE DE VACCINATION CANINE MINIMALISTE - 2007

ÂGE DES CHIOTS	TYPES DE VACCIN
9-10 semaines	Maladie de Carré ( <i>distemper</i> ) + Parvovirose (MLV)
14 semaines	Maladie de Carré ( <i>distemper</i> ) + Parvovirose (MLV)
20 semaine ou plus, si la loi le permet	Rage
1 an	Maladie de Carré ( <i>distemper</i> ) + Parvovirose (MLV) ( <b>Optionnel</b> )
1 an	Rage (vaccin homologué 3 ans) (doit être <b>séparé</b> de tout autre vaccin par un intervalle de 3 à 4 semaines)

Réaliser un dosage du titre d'anticorps contre la maladie de Carré et la parvovirose aux trois ans, ou plus fréquemment, si désiré.

## PROTOCOLE DE VACCINATION FÉLINE MINIMALISTE - 2007

ÂGE DES CHATONS	TYPES DE VACCIN
8 semaines	Panleucopénie + calicivirose + rhinotrachéite (vaccin trivalent K ou R)
12 semaines	Panleucopénie + calicivirose + rhinotrachéite (vaccin trivalent K ou R)
20 semaine ou plus, si la loi le permet	Rage, si et seulement si ce vaccin est requis par la loi
1 an	Panleucopénie + calicivirose + rhinotrachéite (vaccin trivalent K ou R) ( <b>Optionnel</b> )
1 an	Rage (vaccin homologué 3 ans) (doit être <b>séparé</b> de tout autre vaccin par un intervalle de 3 à 4 semaines), si et seulement si ce vaccin est requis par la loi

Réaliser un dosage du titre d'anticorps contre la panleucopénie aux trois ans, ou plus fréquemment, si désiré.

**MLV = vaccin à virus vivants atténués    K = vaccin à virus inactivés    R = vaccin recombinant**